

DISSERTATIO MEDICA  
INAUGURALIS,

DE

VARIOLIS;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, SS. T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NEC NON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS  
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subijcit

JACOBUS DE COURCY,  
HIBERNUS,

A. B. COLLEGII SACROSANCTÆ ET INDIVIDUÆ TRINI-  
TATIS JUXTA DUBLIN,  
ET REGIÆ SOCIETATIS MEDICÆ DUBLINIENSIS SOCIUS  
EXTRAORDINARIUS.

---

Ad diem 12 Septembris, hora locoque solitis.

EDINBURGI:

APUD MURRAY ET COCHRANE.

---

MDCCXCV.

DISSERTATIO MEDICA

IN ANTHROPOLOGIA

DE

VARIOLIS

LAURENTIO PARRONIS

ANNUENTE SUMMO NUMINE

REVERENDISSIMO PATRI

D. GEORGIO BAIRD, S.T.P.

VIRO ILLUSTRISSIMO DOCTO

ET

SENATORI INTEGRISSIMO

ACADEMIAE SCIENTIARUM

ET DE PATRIA SEMPER OPTIME MERITO

PRO GRADU DOCTORIS

CONFERENTIAE PUBLICAE

IN ACADEMIA SCIENTIARUM

PRAECLARIS ANIMI DOTIBUS INSIGNIT

PROFICUOSISSIMO

LABORE PERACTAM

LIBERAM

GRATO, QUO PAR EST, ANIMO

ACADEMIAE SCIENTIARUM

HABITANDO SUBMISIT

REVERENDISSIMO

JACOBUS DE COURCY

AD DIEM 22 SEPTEMBRIS ANNO DOMINI

MDCCCXXXV

APUD MURRAY ET COCHRANES

IN OCCIDENTE

LAURENTIO PARSONS,

EQUITI BARONETTO,

VIRO IMPRIMIS DOCTO,

SENATORI INTEGERRIMO,

ET DE PATRIA SEMPER OPTIME MERITO,

ELOQUENTIA, VIRTUTE, MULTISQUE ALIIS

PRÆCLARIS ANIMI DOTIBUS INSIGNI,

PROPTER BENEFICIA IN SE COLLATA,

GRATO, QUO PAR EST, ANIMO,

HAS STUDIORUM PRIMITIAS DICATAS ESSE VULT

JACOBUS DE COURCY.

DISSERTATIO MEDICA

IN AVGUSTIA

L. LAURENTIO PARSONS

ERUITI BARONETTO

VARIOLIS

AVCTORE JACOBO DE COURCY A. B.  
ET DE PATRIA SEMPER OPTIME MERITO

**V**ARIOLA RUFAT...  
nobis prius tradiderunt...  
tum scripta ad nos pervenerunt...  
LECTER BENEFICIA IN DE COLLATA  
DORA VIXE GENUIS...  
scriptis...  
Variolarum originem a...  
testimo septuagesimo Christi anno...  
mus...  
hunc morbum veteribus...  
notum fuisse medicis...  
GRATIAS ET ALII...  
serm

# DISSERTATIO MEDICA

## INAUGURALIS,

DE

## VARIOLIS.

---

AUCTORE *JACOBO DE COURCY, A. B.*

---

**V**ARIOLARUM historiam medici Arabici nobis primi tradiderunt. Ex Arabicis, quorum scripta ad nos pervenerint, RHAZES, qui in nona vixit centuria, primus hunc morbum descripsit. Secundùm relationem ab illo traditam, Variolarum originem a sexcentesimo vel quingentesimo septuagesimo Christi anno repetere possumus. Argumentum indè nonnulli deducunt, hunc morbum veteribus, et Græcis et Latinis, ignotum fuisse medicis. “ Inquiunt enim, HIPPOCRATES et alii, qui tam accuratè alios descripserunt

“ferunt morbos, hunc silentio non præterirent  
 “si illis notus effet.” Alii contrà notum fuisse  
 antiquis asserunt, et ab HIPPOCRATE, GALENO,  
 AETIO, aliisque veteribus medicis, sub nomine ex-  
 anthematum memoratum; et Arabicos de Variolis  
 mentionem facere, non ut novo morbo, quod  
 certe facerent, si temporibus præcis ignotæ et tum  
 primùm visæ; et quanquam exanthemata veterum  
 cum Variolis modernorum in omnibus non qua-  
 drare videntur, tamèn perpendere debemus, quòd  
 differentia cœli, cibi, regionis, morisque vivendi  
 hominum, eundem morbum multum variare fa-  
 ciat, et Variolæ hodiernorum non eodem sempèr  
 aspectu appareant, imò ea est differentia nonnun-  
 quàm, ut peritus medicus in dubio hereat an hu-  
 jus morbi species quasdam ad genus commune re-  
 ferat, an potiùs ut novos, et non antea visos, de-  
 linearet morbos.

Non mihi animus in præsens hanc discutere  
 rem, nec inquirere utrùm semina morbi rudimen-  
 tis primis humani corporis coætanea sint, et in  
 compositionem ejus intexta in ipsis organizationis  
 primordiis,

primordiis, an in foetum a repurgamentis et impuritatibus materni sanguinis derivantur. Has disquisitiones, quanquam per se graves, et scrutatu dignas, non attingam, sed aliis disputandas relinquam, qui fortasse in hac re consideranda, oleum et operam omninò sibi perire non putarent; mihi vero fat est observare, omnes saltèm semèl huic morbo obnoxios esse, sed infantes omnium maximè, senes vero minimè.

Utrùm hoc accidit, quòd est in humano corpore principium quoddam Variolarum miasma accipiens, quod gradatim imminuitur, et per tempus sæpè penitùs aboletur, an hæc impotentia in senibus morbum progignendi a rigiditate fibrarum et succis imminutis provenit, non possum dicere. Hoc certum est, quòd observamus corpus humanum aliàs huic morbo magis obnoxium, aliàs verò minùs; an a propensitate corporis eo temporis in morbum, an a constitutione quadam aëris tunc prævalente, non ausim affirmare. Fortassè felix concordia amborum necessaria est ad procreandum hoc monstrum, et cùm unum absit alterum

per se inefficax est. Quonam enim alio modo exponere possumus, hominem non hoc corripitur morbo, qui in domo infesta vivit, tractat et versatur cum eo laborantibus, et frequentè ab eorum corporibus effluvia in suum accipit corpus; postea tamèn morbum contrahit, cùm horum nullum culpate potest? Quid dicemus de homine, qui frustra inoculationem passus est, etsi alii eodem tempore, per eundem operatorem, ex eadem infectione, ante et post illum Variolas conceperunt, cùm illum postea videmus morbo laborantem per modum naturalem contracto?

Variolas in naturales et artificiales mihi dividere libet: Fortassè magis propriè dicerem involuntarias et voluntarias. Per prius verbum volo, Variolas per modos sensibus non obvios excitas, sine voluntate ægri; per posterius, eas inoculatione aliisque huic similibus modis communicatas cum consensu et voluntate ægri, vel amicorum ejus. De his singulis ordine jam tradito dicam.

Naturales dividuntur in discretas, distinctas, vel simplices, et concretas, confluentes, complices,

vel



vel malignas; et harum singulæ iterum subdividi possunt in alias atque alias species, denominandas ex numero et forma pustularum, vel aspectu morbi. Crystallinæ, filiquosæ, verrucosæ, sunt nomina diversis hujus morbi speciebus imposita.

Cùm Variolæ naturales aliquem corripiant, primum sentit languorem et lassitudinem; paulò post alia clariora morbi symptomata sequuntur, viz. rigores, horripilatio pandiculatione et oscitatione comitata, febris acuta, multus et constans ardor, multum doloris, in capite, tergo, lumbis, et scrobiculo cordis, nausea et vomitus, inquietudo multa, difficultas respirandi, vox rauca, pruritus narium et aurium, gravitas palpebrarum, oculi rubri, lachrymosi, stupor, somnolentia, terror in somno, urina pallida, convulsiones in infantibus, et ad sudorem propensitas in adultis. Hæc duo postrema symptomata morbum mitiorem et benigniorem sæpè præcedunt.

Si prima hæc febris vehemens sit, non abs re erit sanguinem detrahere ægro; et hinc ætas, constitutio, habitus, et vires ejus respiciendæ sint, et

medici praxin dirigere debeant. Robusto plenoque homini, et ætate florenti, duodecim vel quatuordecim fanguinis unciaë una vice sine detrimento detrahi possint, et par quantitas postero die, si prima venæsectione symptomata non mitescant. Sufficiente fanguinis quantitate effluxâ, quæ pulsuum statui et viribus ægri sempèr adæquanda est, emeticum exhiberi debet. Hic tartarus antimonialis omnibus anteferendus aliis. Corpus ante eruptionem pustularum sine periculo purgari potest. Soda vitriolata, tartarizata, vel phosphorata, aut infusum tamarindorum cum fenna, hanc intentionem expleant.

Eruptio plerumque tertio vel quarto ab invasione morbi apparet die; aliàs citiùs, aliàs verò seriùs. Quo citiùs pustulæ sese ostendent, eo periculosior morbus habetur; et quo seriùs, eo feliciùs morbus terminari putatur. Indè quidam pustularum eruptionem retardare et moderari movent, quantum fieri potest, habendo ægrum aëre in frigidulo; et quidè m maxima adhibenda est cura, ut æger purum et subfrigidum aërem inspi-

ret, quoniàm calidus respirationem difficilem reddit, urinæ secretionem minuit, et pustularum numerum, etiàm in internis corporis partibus, adauget, quarum sequelæ inflammationes, et finem versus gangrænæ, non sine causa timendæ.

Cùm pustulæ in facie et superiori corporis parte nimis confertæ appareant, nonnulli, ad revulsio- nem ad inferiores extremitates faciendam, e mal- leolo pedis sanguinem emittere jubent, pedes aquâ tepidâ vel decocto aliquo emolliente lavare, plan- tis pedum sinapismos applicare, et inferiores ex- tremities benè tectas et calidas fervare, superio- rem verò corporis partem frigidiusculam et aëri expositam habere.

Æger ne lectum petat, quantum potest, pro- hiberi debeat, et deambulare cogatur, si vires si- nent. Hoc regimen corpus temperatum et febrem levio- rem reddet, et ipsum quietis commodis frui faciet, cùm fessa natura lassitudinem diutiùs ferre recusat, sed recreationem lecto et somno quærit.

Ægrotus affatim bibere debeat decoctum hor- dei vel avenæ succo limonum vel aurantiorum  
acidum

acidum factum, aut quarta parte lactis novi mixtum, ferum lactis, cerevisiam tenuem, ferum vinosum, aut factum decoquendis pomis in lacte, emulsiones ex decocto hordei et amygdalis, vel vinum Rhenanum aqua dilutum.

Cibus debet esse tenuis, refrigerans, putrefactioni resistens, facilis concoctu, simulque ægri palato gratus, frumentarium, cibus vocatus *bread-berry*, poma cocta, pista, vel tosta, multum laudantur ad hanc intentionem implendam, et sanè aptissima sunt hoc morbo laborantibus. Jusculum vitulinum vel pullinum his permitti debeat, qui talibus uti solebant; semper enim ægri habitum et vivendi consuetudinem respicere debemus.

Quæ hætenus dixi præcipuè Variolas discretas aut simplices respiciunt. Possunt mutatione parva, quæ medici judicio relinquenda, etiam confluentibus accommodari.

Confluentes dignoscuntur apparendo citius, numero et figura pustularum; et ut in discretis violentia symptomatum, pustulis apparentibus, defævit, sic e contrà in hac specie, symptomata perstant

stant omnia, imò ingravescent nonnunquàm etiam post pustularum eruptionem, quanquàm sæpè mitescent cùm pustulæ jam apparuerint.

Symptomata discretarum omnia confluentes quoque comitantur, sed gradu vehementiori. Salivatio plerùmque adultos in hac specie molestat, quæ aliquandò a prima eruptione, plerùmque vero secundo vel tertio eruptionis die incipit. Materies primò est tenuis, et magna copia exputa, sed decimo vel undecimo ferè die, aut citiùs, lenta et viscida evadit, et magna cum difficultate rejicitur. Et ut hæc salivatio et tumefactio faciei decrescent undecimo vel duodecimo die, manus et pedes tumescere debeant, si jam non sint tumidi; si sint, in eo statu aliquot dies permanere debeant.

Infantes in hac specie plerumque diarrhœâ laborant, quæ quandocunquè incipit per reliquum morbi cursum durat, si non intempestivè supprimitur.

Petechiæ aliquandò inter pustulas apparent. Hæ dissolutionem et putredinem sanguinis et humo-

rum denotant; ideoquè cortex Peruvianus statim dari debet, dosibus tantis quantas ægri stomachus ferre valebit: vinum rubrum quoque hic non parca dandum manu.

Hæc formula corticem exhibendi a nonnullis laudatur.

R. pulv. cort. Per. ℥ij

Aq. fontanæ ℥iij.

Aq. cinnam. simp. ℥i.

Syrup limon. ℥ij. m. addendo

Spiritus vitrioli ten. q. s. ad. gratum.

Acorem. Hujus misturæ cochlearia magna iij. adulto singulis horis exhiberi debeant, infanti verò, i. si stomachus ferre valebit. SYDENHAM, spiritus vitrioli guttas XL magno in vehiculo, solitus erat dare iis ex patientibus, qui talem dosin ferrent, et paucas post horas, sine discriminis metu, dosis repetebatur. Et fanè mira efficiuntur per corticem, vinum, et acida, talibus in circumstantiis. Et ut petechiæ, quocunque sint colore, sanguinem dissolutum denotant, propositum itaque erit hunc addensare. Nihil aptius ad hoc efficiendum

ciendum quàm acida, vitriolicum præfertim. Quidam præcipiunt tres partes aluminis, et unam succi inspissati, *dragon's blood* vocati, commixtas, liquefieri super ignem, et massam frige factam in pulverem redigi; hujus pulveris scrupulum, cum conservæ rofarum quantum sufficit, in bolum formari, et pro dosi dari. MEAD ait, convenientissimum spiritus vitrioli exhibendi modum esse in tinctura rofarum, cujus quinque vel sex cochlearia possint dari sæpiùs in die.

Ægri potus in tali statu generosus esse debet, sicùt vinum vel negus acidulus factus acido vitrioli, aceto, succo limonum, gelatinâ ribium, vel similibus. Cibus sit poma cocta aut pista, ut antea dixi, cerasa condita, pruna, et alii hujusmodi fructus acidæ naturæ.

Cùm eruptio subitò subsidit, emplastra epispastica statim applicanda sunt carpis, et pedum malleolis; et ægri spiritus suffulciendi cardiacis; cyathus vini meracioris, vel aquâ menthæ aut cinnamomi diluti, huic intentioni respondet.

Cùm Variolæ confluentes sint pessimi generis,

authores quidam monent pustulas aureâ vel argenteâ aciculâ aperiri, pusque abstergi, et corpus involvi emplastro meliloti; hac enim methodo resorptionem materiæ putridæ per venas lymphaticas magna ex parte prohiberi sperant, quæ præcipua est causa febris secundariæ tam metuendæ, quippè quæ tam sæpè fatalis in hac specie extitit.

Cum res ad desperationem venit, authores proponunt incisiones ad vivum usquè multis in corporis partibus fieri, et fomentationes ex decocto aliquo emollienti, addito spiritu vini camphorato, partibus adhibendas, ad suppurationem promovendam, effluxumque puris accersendum, huncque effluxum digestivis fovendum idoneis. Cùm omnia in tuto sint, morbo feliciter finito, alvus semel atque iterum subducenda est.

Quantum temporis variolosum miasma modo communi contractum requirit ad suos producidos effectus, non adhuc, quoad ego scio, pro certo fixum. GEORGIUS FORDYCE, medicus non contemnendus, in tractatu cui titulo, *Evidence of Medicine* dicit, quod ipse, Doctorem RUTHER-



FORD, hujus collegii quondam professorem celeberrimum, in prælectionibus audivisset narrantem, de manu militum iter faciente per vicum in quod Variolæ grassabantur, quorum multi, duodecimo post die, morbo corripiebantur. Hoc sane probabile est argumentum, virus Variolosum, via communi receptum, duodecim postulare dies ad vires suas exerendas; et nobis confidentiam et animos suppeditet, nè timeamus immunes a Variolis in loca illis infesta adducere, Variolarum inferendi gratiâ; insitæ enim citiùs sese ostendent, et quoniàm sempèr mitiores, eventu suo bono, malum, a naturalibus timendum, antecapiunt.

INOCULATIO, vel methodus inferendi Variolas artificiales vel voluntarias, pars altera subjecti mei, non benè nota erat in Europa ante initium præsentis centuriæ. Anno 1713, Doctores Medici TIMONI et PYLARINI, alius aliam hujus novi inventi relationem et modum operandi, a Constantinopoli transmiserunt. Ex hisce relationibus, Græcam

Græcam aniculam hanc artem illuc primò exercuisse discimus. Secundum TIMONI relationem, Græci hanc exercebant artem 40 annos ante ipsius adventum Constantinopolim, anno 1705. PYLARINI verum inventorem ignotum esse affirmat, et quòd in illa Græciæ parte Theffalia vocata primò exerceretur, quòd alias vicinas urbes et regiones pervagata, tandèm Constantinopolim pervenisset, ubi diù neglecta fuit.

Verifimile est Circassianos vel Georgianos hujus artis pretiosæ inventores fuisse, quippè qui insignitèr solliciti sint de faciei venustate servanda, et omnem studeant artem, quæ eam meliorem et pulchriorem reddere potest; et per hos in Græciam illatam fuisse primùm.

Non omninò mirandum est hanc novam Variolas producendi methodum apud Turcas non benè acceptam, cùm hujus populi ignorantiam et religionem consideremus. Monarchia non est natale solum artium et inventionum; florent melius et luxuriantur magis in sibi congenito, reipublicæ libertatis solo. Quòd rejiceretur, imò penè strangularetur

retur in ipso ortu, idque in regionibus ubi imperium minùs absolutum, et ubi lumen religionis et philosophiæ radiis fulgentibus illuxit, ad abigendas ab animo densas mœstæ superstitionis nebulas, mihi mirum videtur.

Cùm hæc nova ars in hanc mundi partem primò introducta esset, cœtus et factiones ad gradum retardandum, et gloriam ejus obscurandum, ubique formabantur. Statim limis oculis Invidia, cum sua pedisequorum cohorte inferna, in illam infurrexit; et cùm per se non fatis esset ad progressum et incrementum reprimendum, ad auxilium suum Superstitionem vocavit. Domina subtristis Superstitio, vestem induta Religionis, sistrum suum concussit, quod, Tritonis conchæ haud absimilitèr, terram sub utroque jacentem Phœbo implevit; quo audito, statim Evangelii Ministri ad arma currunt, anathemata in illam Pulpita omnia jaculantur. Concionator extemporaneus \*  
cadi

---

\* Author alludit ad hunc POPII versum, "HENLEY'S  
"Gilt Tub," &c. Vide Dunciadis lib. secundi initium.

cadi, cum doctrinâ regenerationis, gratiæ liberæ, et internæ manifestationis, haud minùs obstrepebat, quàm sacerdos superstitiosus, vel liberalior minister. Doctores omnium sectarum, quantumvis inter se discrepantes in dogmatibus et opinionibus de rebus religiosis, in hostem communem consenserunt; sed veritas et utilitas falsitatem et machinationem superaverunt, et inoculationis propugnatores, post pugnas non paucas, victoriam retulerunt.

Hic erat modus operandi apud Græcos.

Operator, aciculâ chirurgicâ, vel lanceolâ, cutem multis in locis vulnerabat, sic ut sanguis sequeretur; materiam variolosam, a pustulis recentem locis vulneratis impositam, cum sanguine benè commiscuit; tunc pars dimidio juglandis putamine tegebatur, nè infectio abstergeretur; paucis post horis, totus apparatus removebatur. Hic notandum est, quòd rarissimè uterentur materiâ Variolis infitis desumptâ ad alios inoculandos. Operatio fiebat in individuis omnium ætatum, sexuum, et temperamentorum, et in pessima aëris constitutione;

tionem ; nullus tamen obiit Variolis infectione excitis. Operatio nonnunquam peragebatur frustra. Tempus opportunissimum habebatur initium hyemis, vel veris finis. Eruptio apparebat septimo exeunte, vel octavo ineunte die.

Variolæ artificiales multa habent commoda, quibus omninò carent naturales ; quorum, quòd possumus tempus eas communicandi eligere, non est minimum.

Infantes non existimantur idonei ad inoculandum, propter teneritudinem, propensitatem ad spasmos, et impotentiam obluendi impetui gravi morbi, si talis contingeret illis. Sed nonnullos vidi infantes, unam verò quatuor tantum menses natam, hyeme proximè elapsâ, in Nosocomio Regio hujus loci, tam benè morbum sustinere, curâ ingeniosi Doctoris HOME, ut eos vix ægrotares.

Ætas ad operationem aptissima, annus tertius habetur, vel cum dentes primi jam apparuerint omnes.

An corpus præparare ad Variolas accipiendas necesse sit, non inter omnes adhuc convenit.

Alii enim putant, quòd nulla præparatio necessaria sit illi, qui benè valet; alii verò, e contrà, cum observaverint Variolas naturales feliciùs procedere post magnam aliquam evacuationem, qualis est salivatio, longam præparationem suadent. Media inter has duas vias tutissima est ineunda, neque vires patientis, nimis longa et jejuna præparatione absumere, nec temerè infectionem communicare homini, cujus corpus est delicatè tractatum, humoribus crassis et impuris plenum, et liquoribus spirituosis fortassè inflammatum. Præparatio reddi potest facillima et simplicissima. Paucae doses medicamenti alicujus laxantis, qualis pulvis jalappæ compositus, infusum tamarindorum cum fenna, sòda vitriolata, tartarizata, vel phosphorata, sufficient.

Authores rem nullius momenti putant, utrùm a Variolis discretis vel confluentibus materiam ad alios inoculandos sumas, nisi verò ad amicis eorum gratificandum; quoniàm bonus vel malus eventus pendet magis a conditione corporis, puritate vel pravitate succorum ejus, constitutione aëris, et

modo

modo quo tractatur morbus, quàm ab ulla differentia in qualitate materiæ.

Mos Variolos emptione comparandi a multis invaluit annis in Wallia Australi, a nonaginta minimum ante inoculationem in hac Europæ parte notam. Pus emptum, et pustulis defumptum maturis, brachiorum cuti multis in locis infricabatur, vel loca pungebantur aciculis, talibusve instrumentis pure imbutis; et quamvis præparationem neglexerant, tamèn res benè successit.

Chinenses hoc modo Variolas communicant; crustas illarum gossipio involutas naribus ejus subdunt cui morbum arcessere volunt. Hæc methodus non multùm differt à modo naturali morbum contrahendi, faltem non minùs habet periculi.

SUTTON, anno 1755, novam introduxit methodum, quæ reverà nihil aliud erat quàm Græcæ aniculæ praxin simplicissimam renovare. Totà ejus ars et secretum constabat in exhibenda pilula Mercuriali ante operationem, et iterùm priusquam eruptio appareret, et strictè regimen anti-phlogisticum observando, et patientes suos aëri puro

puro et subfrigido exponendo, quæ ante eum omnes neglexerant practici.

Operatio hoc modo fit ; punctura facienda in brachio phlebotomi mucrone, in pus variolosum, recentèr e pustulis sumptum, priùs immerfo, vel mucro phlebotomi modè fiat filo laneo aut gossipino materiâ variolosâ benè imbuto, et aquâ frigidâ madido.

Si tumefactio aut inflammatio in brachio appareat octavo vel nono post operationem die, aut quovis alio tempore, febre eruptiva durante, lavare liceat frequentèr aquâ frigidâ. Quòd ad potum, aërem frigidum, &c. attinet, tam benè nota sunt, ut mihi non opus sit, hoc in loco, in illis morari. Cùm totus cursus feliciter finitus fit, alvus semèl atque iterùm purgari debeat.

F I N I S.